

◎ 会员登录

用户名:

密码:

验证码:

J Z F 4 P 看不清?换一张

◎ 快速通道

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

脑卒中后抑郁症对患者肢体感觉功能和日常生活活动能力的影响 [点此下载全文](#)

尤志珺, 周少华, 席刚明

十堰, 湖北十堰市郟阳医学院附属人民医院神经内科

基金项目:

DOI:2009年02期

摘要点击次数: 2

全文下载次数: 1

摘要:

目的探讨脑卒中后抑郁症(PSD)对患者肢体感觉功能和日常生活活动(ADL)能力的影响。方法将100例脑卒中患者根据综合医院焦虑/抑郁情绪测定量表(HAD)评分分为脑卒中后抑郁组和非抑郁组,2组均给予常规药物、康复治疗及感觉功能训练,抑郁组同时给予抗抑郁药物治疗,于治疗前和治疗3个月后分别采用Fugl-Meyer评分法和Barthel指数(BI)评定2组受累侧感觉功能和ADL能力。结果2组患者的感觉功能及BI评分较治疗前均有明显改善($P<0.01$)(排除未服抗抑郁药的5例抑郁组患者);抑郁组的感覺功能及BI评分结果较非抑郁组差($P<0.01$);抑郁组中因故未服用抗抑郁药物的5例患者,其治疗前、后的感觉功能及BI评分结果差异无统计学意义($P>0.05$)。结论PSD可严重影响患者肢体感觉功能和ADL能力的康复;及时有效的抗抑郁治疗和康复训练可促进神经功能和ADL能力的提高。

关键词: 脑卒中; 抑郁; 感觉功能; 日常生活活动能力

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027)83662874 传真:83663264 E-mail:cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发