

药物与临床

氟桂利嗪治疗椎基底动脉供血不足性眩晕75例

雷革胜,林宏,张莉红,井晓蓉

第四军医大学唐都医院神经内科,西安710038

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:观察氟桂利嗪对椎基底动脉供血不足性眩晕的临床疗效和实验室指标改变.方法:椎基底动脉供血不足性眩晕患者75例,据眩晕程度进行分类,重度40例,中度30例,轻度5例;瞬目反射、脑干听觉诱发电位、经颅超声多普勒阳性率分别为82.0%,70.0%和85.0%,患者均每晚口服氟桂利嗪10 mg,连续4周.结果:治疗后眩晕重度3例、中度2例、轻度8例、完全缓解62例;瞬目反射、脑干听觉诱发电位、经颅超声多普勒阳性率为分别6.0%,4.0%和8.0%.结论:氟桂利嗪治疗椎基底动脉供血不足性眩晕临床疗效显著.瞬目反射、脑干听觉诱发电位、经颅多普勒超声可作为疗效观察的实验室客观指标.

关键词 [氟桂利嗪](#) [眩晕](#),[椎基底动脉供血不足性](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章:[1004 0781\(2002\)10 0647 02](#)

通讯作者:

作者个人主页:雷革胜;林宏;张莉红;井晓蓉

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (990KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“氟桂利嗪”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [雷革胜](#)

• [林宏](#)

• [张莉红](#)

• [井晓蓉](#)