

神经科用药专栏

苯妥英钠所致变态反应

王庆<sup>1</sup>, 龚守会<sup>2</sup>, 刘斌<sup>3</sup>, 孙喜堂<sup>4</sup>

1.武汉市第九医院神经内科, 430080; 2.湖北省襄樊市第一医院神经内科, 441000; 3.武汉市第九医院皮肤科, 430080; 4.华中科技大学同济医学院附属协和医院神经内科, 武汉 430022

收稿日期 2006-9-20 修回日期 2006-10-17 网络版发布日期 2007-1-23 接受日期 2006-10-17

**摘要** 目的 探讨苯妥英钠所致变态反应的临床特点。方法 观察苯妥英钠抗癫治疗时发生的皮疹等变态反应。结果 1 380例服用苯妥英钠的患者中共有37例出现皮疹、发热等变态反应(发生率2.68%), 变态反应发生在用药后2~40 d, 一般在服药后约2周出现。结论 苯妥英钠所致变态反应发生率较低, 减药或停药后大多数很快好转。

**关键词** [苯妥英钠](#) [变态反应](#)

分类号 [B](#)

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2007\) 02-0165-01](#)

通讯作者:

王庆 [wqlb3344@163.com](mailto:wqlb3344@163.com)

作者个人主页: 王庆<sup>1</sup>; 龚守会<sup>2</sup>; 刘斌<sup>3</sup>; 孙喜堂<sup>4</sup>

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1094KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“苯妥英钠”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [王庆](#)
- [龚守会](#)
- [刘斌](#)
- [孙喜堂](#)