

用药指南

女性精神分裂症患者应用苯二氮类药物分析

王鹤秋, 于恩彦

浙江省立同德医院精神科, 杭州311122

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-29 接受日期

摘要 目的分析苯二氮类(BDZ)药物在女性精神分裂症患者中的应用情况。方法采用自制量表对住院的119例女性精神分裂症患者使用BDZ情况进行调查。结果抗精神病药物合用BDZ者56例(47.06%), 以应用硝西泮、氯硝西泮为多。结论苯二氮类辅助抗精神病药治疗精神分裂症使用率很高, 疗效好, 使用安全, 但临床上应注意合理用药, 避免医源性药物依赖。

关键词 [苯二氮类](#) [精神分裂症](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2005\) 04-0347-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 王鹤秋; 于恩彦

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1880KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“苯二氮类”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [王鹤秋](#)

• [于恩彦](#)