

精神科用药专栏

氟伏沙明治疗儿童少年强迫症40例

白雪光, 舒畅, 白晶

武汉大学人民医院精神科, 430060

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-9-21 接受日期

**摘要** 目的观察氟伏沙明治疗儿童和少年强迫症的疗效及不良反应。方法40例强迫症患者给予氟伏沙明 $25\sim 200\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ ,  $<10$ 岁儿童患者, 起始药量 $25\text{ mg}$ , PO, qn,  $\geq 10$ 岁患者, 起始药量 $50\text{ mg}$ , PO, qn。在治疗前和治疗第2, 6周末用YALE BROWN (Y-B) 强迫量表、临床总体印象量表及不良反应量表对疗效和不良反应进行评定。结果治疗2周后Y-B量表总分、强迫行为分降低, 与治疗前比较差异有极显著性 ( $P<0.01$ )。治疗6周后 Y-B量表总分、强迫思维分、强迫行为分与治疗前比较差异均有极显著性 (均 $P<0.01$ )。强迫行为分减分率高于强迫思维减分率 ( $P<0.01$ )。早期有思睡、恶心, 治疗第6周后未发现明显不良反应。结论氟伏沙明是一种有效且安全性较好的治疗儿童和少年强迫症的药物。

**关键词** [氟伏沙明](#) [强迫症](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2005\) 10-0896-01](#)

通讯作者:

作者个人主页: 白雪光; 舒畅; 白晶

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1217KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“氟伏沙明”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [白雪光](#)

• [舒畅](#)

• [白晶](#)