

精神科用药专栏

阿立哌唑对舒必利所致高催乳素血症的影响

陈海支,俞柏润,杨身国,沈仲夏,糜屈,蒋永红

(浙江省湖州市第三人民医院精神科,313000)

收稿日期 2006-12-11 修回日期 网络版发布日期 2007-10-8 接受日期

摘要 目的 探讨阿立哌唑对舒必利所致高催乳素血症的影响及安全性.方法 对61例服用舒必利6周后的精神分裂症患者,随机分为治疗组31例,对照组30例.治疗组在服用原药的基础上,每天加用阿立哌唑10 mg,对照组维持以前的药物治疗.服用舒必利治疗第6周及第9周末分别测定患者血清催乳素水平,并进行比较.同时用不良反应量表(TESS)评定不良反应.结果 经阿立哌唑治疗后,治疗组患者血清催乳素水平明显下降($P < 0.01$),对照组血清催乳素水平无明显变化.两组TESS评分差异无显著性($P > 0.05$).结论 阿立哌唑对舒必利所致高催乳素血症有一定的治疗作用,并且相对安全.

关键词 [阿立哌唑](#) [舒必利](#) [精神分裂症](#) [催乳素](#)

分类号 [R971.4](#) [R749.3](#)

DOI:

对应的英文版文章:[261786](#)

通讯作者:

作者个人主页: 陈海支;俞柏润;杨身国;沈仲夏;糜屈;蒋永红

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1238KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“阿立哌唑”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [陈海支](#)
- [俞柏润](#)
- [杨身国](#)
- [沈仲夏](#)
- [糜屈](#)
- [蒋永红](#)