

精神科用药专栏

阿立哌唑与利培酮治疗精神分裂症的疗效比较

蒋永红,沈仲夏

(浙江省湖州市第三人民医院精神科,31300)

收稿日期 2007-2-8 修回日期 网络版发布日期 2007-10-8 接受日期

摘要 目的 考察阿立哌唑治疗精神分裂症的有效性及安全性. 方法 60例符合CCMD-3精神分裂症患者随机分为治疗组和对照组各30例. 治疗组给予阿立哌唑,起始剂量 $5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,以后每周增加 $5 \sim 10 \text{ mg}$,治疗剂量 $10 \sim 30 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$;对照组给予利培酮,起始剂量 $1 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,隔 $3 \sim 7 \text{ d}$ 增加 1 mg ,2周内加至 $4 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,治疗剂量 $2 \sim 6 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,疗程均为8周. 采用阳性症状与阴性症状量表及不良反应症状量表评定疗效与不良反应. 结果 治疗8周后,治疗组显效率63.3%,有效率90.0%,对照组显效率63.3%,有效率86.7% ($P > 0.05$). 两组治疗后阳性症状与阴性症状评分均显著下降 ($P < 0.01$),治疗组不良反应发生率显著低于对照组 ($P < 0.01$). 结论 阿立哌唑与利培酮对精神分裂症疗效相当,前者所致不良反应发生率低,是一种安全有效的抗精神病药物.

关键词 [阿立哌唑](#) [利培酮](#) [精神分裂症](#)

分类号 [R971.4](#) [R749.3](#)

DOI:

对应的英文版文章:[w270256](#)

通讯作者:

作者个人主页: 蒋永红;沈仲夏

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1224KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“阿立哌唑”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [蒋永红](#)
- [沈仲夏](#)