

## 药物与临床

### 米氮平与阿米替林治疗抑郁症并发慢性疼痛的对照研究

朱毅平

(浙江省湖州市第三人民医院精神科, 313000)

收稿日期 2007-3-20 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的 比较米氮平与阿米替林治疗抑郁并发慢性疼痛的效果和不良反应. 方法 68例同时符合抑郁症及慢性疼痛诊断标准的门诊患者随机分为治疗组36例,对照组32例. 患者使用阿普唑仑,剂量控制在0.2 ~0.8 mg·d<sup>-1</sup>. 治疗组加用米氮平,第1天15 mg,第4天30 mg,第7天如有必要可增加到45 mg,均为晚餐后1次顿服. 对照组加用阿米替林,第1天50 mg,第4天100 mg,第7天150 mg,分中、晚餐后2次口服. 入组前及治疗后的第7,14,28天分别对患者进行汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分、不良反应量表(TESS)评分、视觉模拟评分(VAS)评定. 结果 入组时两组患者HAMD、HAMA、VAS评分差异无显著性(P>0.05). 治疗第7天,治疗组的HAMD、HAMA、VAS评分迅速下降,与入组时比较差异有极显著性(P<0.01),并显著或极显著低于对照组(P<0.05或P<0.01). 治疗第28天两组HAMD、HAMA、VAS评分与入组时比较差异有极显著性(P<0.01). 但两组间HAMD、HAMA、VAS评分比较差异无显著性(P>0.05). 两组患者有效率差异无显著性(P>0.05). 治疗组TESS总分均显著或极显著低于对照组(P<0.05或P<0.01). 结论 米氮平治疗抑郁并发慢性疼痛患者,能迅速控制抑郁和焦虑症状,且能有效地改善或者消除疼痛症状,并且不良反应相对较轻.

**关键词** [米氮平](#) [阿米替林](#) [抑郁症](#) [疼痛,慢性](#)

分类号 [R971.43](#) [R749.41](#)

DOI:

对应的英文版文章:[w270251](#)

通讯作者:

作者个人主页: 朱毅平

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1246KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“米氮平”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [朱毅平](#)