

精神科用药专栏

三环类抗抑郁药物与选择性5-羟色胺再摄取抑制药治疗抑郁症致失眠焦虑激越与躁狂的Meta分析

金卫东, 陈正昕, 童振华, 王佩蓉, 陈炯, 马永春, 王鹤秋, 邢葆平

(浙江省立同德医院、浙江省精神卫生中心, 310012)

收稿日期 2007-1-21 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 分析三环类抗抑郁药物(TCA)与选择性5-羟色胺再摄取抑制药(SSRI)治疗抑郁症引发失眠、焦虑、激越与躁狂的差异. 方法 应用循证医学的Meta分析, 采用固定效应模型(fixed effects model, FEM)法对符合标准的63项对照研究文献进行评价. 结果 SSRI与TCA治疗抑郁症出现失眠、激越差异有显著性(16%和3.8%, OR=5.05, 95%CI: 4.06~6.30, $\chi^2=181.7$, $P<0.01$; 8.7%和3.5%, OR=2.80, 95%CI: 1.82~4.76, $\chi^2=5.09$, $P<0.01$), 但是焦虑、躁狂发作的差异无显著性(10.7%和8.9%, OR=1.75, 95%CI: 0.99~3.10, $\chi^2=2.39$, $P>0.05$; 2.2%和3.8%, OR=1.68, 95%CI: 0.90~3.13, $\chi^2=1.90$, $P>0.05$). 结论 在治疗抑郁症中, SSRI比TCA更可引发失眠、激越, 应特别加以关注.

关键词 [抗抑郁药物](#), [三环类](#) [5-羟色胺再摄取抑制药](#) [副作用](#) [躁狂发作](#) [循证医学](#)

分类号 [R971.43](#)

DOI:

对应的英文版文章: [w280163](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1216KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“抗抑郁药物, 三环类”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [金卫东](#)
- [陈正昕](#)
- [童振华](#)
- [王佩蓉](#)
- [陈炯](#)
- [马永春](#)
- [王鹤秋](#)