

药物与临床

阿立哌唑治疗舒必利所致高催乳素血症70例

宋梓祥,陈琪,徐乐平,蔡占魁,纪菊英,汪卫华,汪广剑,孙剑,赵汉清

(解放军第102医院精神科,江苏常州213003)

收稿日期 2008-5-19 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨阿立哌唑治疗舒必利所致高催乳素血症的疗效及安全性. 方法 60例男性、80例女性舒必利所致高催乳素血症患者,分别随机分为治疗组、对照组(男性:治疗组、对照组各30例;女性:治疗组、对照组各40例). 维持舒必利治疗不变,分别加用阿立哌唑(5 mg)、维生素C治疗,疗程6周. 于治疗前和6周末检测催乳素(PRL);评定简明精神病量表(BPRS)、不良反应量表. 结果 6周末,治疗组男、女性PRL分别为(21.5±6.4)和(26.9±7.1) $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,较基线(84.8±15.9)和(136.5±38.2) $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 下降,差异有极显著性(均 $P<0.01$);对照组男、女性PRL分别为(79.3±15.5)和(122.8±34.0) $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,与基线(85.1±16.7)和(129.8±37.9) $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ 比较差异无显著性(均 $P>0.05$). 治疗组男、女性PRL的下降率分别为(74.7±5.9)%和(78.3±9.5)%,高于对照组PRL的下降率[分别为(6.5±5.8)%, (4.9±4.3)%](均 $P<0.01$). 治疗组和对照组男、女性BPRS评分与基线的差异均无显著性(均 $P>0.05$);两组总体不良反应发生率相近($P>0.05$). 结论 阿立哌唑治疗舒必利所致男、女性高催乳血症有效、安全.

关键词 [阿立哌唑](#) [舒必利](#) [高催乳素血症](#) [精神分裂症](#)

分类号 [R971.4](#) [R749.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.04.030

对应的英文版文章: [2009-4-479](#)

通讯作者:

作者个人主页: 宋梓祥;陈琪;徐乐平;蔡占魁;纪菊英;汪卫华;汪广剑;孙剑;赵汉清

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(660KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“阿立哌唑”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [宋梓祥](#)
- [陈琪](#)
- [徐乐平](#)
- [蔡占魁](#)
- [纪菊英](#)
- [汪卫华](#)
- [汪广剑](#)
- [孙剑](#)
- [赵汉清](#)