

精神科用药专栏

坦度螺酮联合舍曲林治疗伴有焦虑症状的抑郁症30例

许秋霞,支胜利

(浙江省湖州市第三人民医院精神科,313000)

收稿日期 2010-3-4 修回日期 2010-6-29 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨坦度螺酮联合舍曲林治疗伴有焦虑症状的抑郁症疗效. 方法伴有焦虑症状的抑郁症患者64例,按入院顺序交叉分为治疗组和对照组各32例. 治疗组给予坦度螺酮,采用固定剂量 $30\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ (10 mg,tid),舍曲林 $50\sim 200\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$;对照组单用舍曲林治疗, $50\sim 200\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,qd,po. 治疗6周. 于治疗前及治疗第2,4,6周末采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评定疗效,采用药物不良反应量表(TESS)于治疗6周末评定不良反应. 结果 治疗组和对照组分别脱落2和1例. 治疗组和对照组痊愈率分别为43.3%和32.3%,有效率分别为83.3%和58.1%,两组痊愈率比较差异无显著性($P>0.05$),但有效率比较差异有显著性($P<0.05$). 治疗组治疗第2,4,6周末HAMD和HAMA评分均比对照组显著下降($P<0.05$ 或 $P<0.01$),两组治疗后不良反应比较差异无显著性($P>0.05$). 结论 坦度螺酮联合舍曲林治疗伴有焦虑症状的抑郁症具有良好的疗效和安全性.

关键词 [坦度螺酮](#) [舍曲林](#) [抑郁症,焦虑症状](#)

分类号 [R971.43](#) [R749.41](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.10.009

对应的英文版文章:[2010-10-1277](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(1198KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“坦度螺酮”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [许秋霞](#)

• [支胜利](#)