

## 药物与临床

### 氟西汀联合多潘立酮治疗糖尿病胃轻瘫38例

谢海鹰<sup>1</sup>, 万其容<sup>2</sup>

(1. 武汉市第一医院内分泌科, 430022; 2. 华中科技大学同济医学院附属梨园医院精神科, 武汉 430077)

收稿日期 2011-8-10 修回日期 2011-10-5 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的 观察氟西汀治疗糖尿病胃轻瘫的有效性和安全性. 方法 76例糖尿病胃轻瘫并发抑郁的患者随机分为对照组和治疗组各38例. 所有病例均应用饮食、运动、胰岛素控制血糖, 降压, 调脂等一般处理. 治疗组在此基础上加用氟西汀20 mg, qd, 多潘立酮10 mg, tid, po; 对照组给予多潘立酮10 mg, tid, po. 观察两组消化道症状、不良反应, 测定两组汉密尔顿抑郁量表17项(HAMD-17)评分. 结果两组治疗后消化道症状均有改善( $P < 0.05$ ), 但治疗组消化道症状改善较对照组明显( $P < 0.05$ ); 对照组总有效率65.8%, 治疗组总有效率89.5%, 治疗组疗效优于对照组, 差异有统计学意义( $\chi^2 = 6.13, P < 0.05$ ); 治疗组治疗前后HAMD评分分别为(14.7 ± 2.9)和(10.8 ± 2.3)分, 差异有统计学意义( $t = 4.41, P < 0.01$ ), 对照组治疗前后HAMD评分分别为(14.4 ± 2.3)和(13.8 ± 1.8)分, 差异无统计学意义( $t = 1.39, P > 0.05$ ). 结论 氟西汀联合多潘立酮治疗糖尿病胃轻瘫并发抑郁情绪效果较好, 并且疗效优于单用多潘立酮.

**关键词** [氟西汀](#) [多潘立酮](#) [糖尿病](#) [胃轻瘫](#)

分类号 [R971.4](#) [R749.24](#)

DOI: 10.3870/yydb.2012.04.015

对应的英文版文章: [1004-0781\(2012\)04-0445-03](#)

通讯作者:

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1139KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“氟西汀”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [谢海鹰](#)
  - [万其容](#)