

药物与临床

曲唑酮治疗精神分裂症伴发焦虑症状31例

冯少慧

(武汉市精神卫生中心, 430022)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 摘要目的探讨曲唑酮对伴发焦虑症状的精神分裂症患者的疗效。方法伴发焦虑症状的精神分裂症患者61例, 随机分为治疗组31例, 对照组30例。两组原有抗精神病药物治疗不变, 治疗组加用曲唑酮25~100 mg/d, qd, po。在治疗前及治疗后第4, 8周末均用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评定焦虑的严重程度, 用简明精神病评定量表(BPRS)评定精神分裂症的病情程度, 用个人和社会功能量表(PSP)评定其社会功能。结果治疗组和对照组在第8周末的HAMA总分分别为(15.32±4.13), (17.97±3.54)分; 躯体性焦虑因子分别为(7.32±2.86), (9.10±2.55)分(P<0.05); BPRS总分分别为(32.45±3.33), (34.77±4.63)分(P<0.05); 焦虑忧郁因子分别为(8.48±0.81), (10.90±2.03)分(P<0.01); PSP评分分别为(70.55±5.21), (66.17±6.07)分(P<0.01)。结论曲唑酮治疗伴发焦虑症状精神分裂症患者, 在改善焦虑症状的同时也有利于病情的改善及社会功能的恢复。

关键词 [关键词曲唑酮; 精神分裂症; 焦虑; 社会功能](#)

分类号 [R971.41; R749.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2012.06.015

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 06-0728-03](#)

通讯作者:

作者个人主页: 冯少慧

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1119KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“关键词曲唑酮; 精神分裂症; 焦虑; 社会功能”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [冯少慧](#)