

## 药物与临床

帕利哌酮缓释片对精神分裂症男性患者的疗效及社会功能影响

苏伟, 那万秋, 李建华, 杨剑虹, 陈海支, 周虎江

(浙江省湖州市第三人民医院精神科, 313000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 摘要目的观察帕利哌酮缓释片对男性急性期精神分裂症患者的疗效及社会功能的影响。方法将65例患者随机分为治疗组33例, 对照组32例, 进行为期12周的开放性对照研究。治疗组给予帕利哌酮缓释片6 mg/d-1; 对照组给予利培酮片1 mg/d-1 起始, 1周内增至4 mg/d-1。于治疗前、治疗第2, 4, 8, 12周末分别采用阳性与阴性症状量表(PANSS)、个人和社会功能量表(PSP)、不良反应症状量表(TESS)评定疗效、社会功能和不良反应, 并进行实验室监测。于治疗前和治疗第4, 8, 12周末检测两组的血清催乳素水平。结果至研究终点, 两组有效率相似(66.7%, 62.5%,  $P>0.05$ ); 两组PANSS评分总分及分量表分较治疗前均有明显下降, PSP总分显著高于治疗前, 差异有统计学意义( $P<0.05$ ); 组间比较, 治疗第2, 12周末时, 治疗组显著优于对照组( $P<0.05$ )。治疗后, 两组受试者血清催乳素水平均明显升高( $P<0.05$ ), 对照组升高更明显( $P<0.05$ )。治疗组血清催乳素水平在治疗8, 12周末较治疗4周末持续下降, 且无高催乳素血症相关症状。两组均未出现严重不良反应, 治疗组不良反应较轻微( $P<0.05$ )。结论帕利哌酮缓释片治疗男性急性期精神分裂症的疗效与利培酮相当, 安全性好, 能有效改善社会功能。

**关键词** [关键词帕利哌酮; 利培酮; 精神分裂症; 社会功能; 催乳素](#)

分类号 [R971.41; R749.3](#)

DOI: [10.3870/yydb.2012.06.016](#)

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 06-0731-04](#)

通讯作者:

作者个人主页: [苏伟; 那万秋; 李建华; 杨剑虹; 陈海支; 周虎江](#)

## 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1149KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“关键词帕利哌酮; 利培酮; 精神分裂症; 社会功能; 催乳素”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [苏伟](#)
- [那万秋](#)
- [李建华](#)
- [杨剑虹](#)
- [陈海支](#)
- [周虎江](#)