

精神科用药专栏

喹硫平联合氟伏沙明治疗难治性强迫症31例

朱倩芸,冯晓薇

(武汉市优抚医院精神科,430023)

收稿日期 2012-2-16 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨喹硫平联合氟伏沙明治疗难治性强迫症的疗效.方法将68例强迫症患者随机分为治疗组和对照组.治疗组34例,给予喹硫平 $0.1\sim 0.6\text{ g}\cdot\text{d}^{-1}$,平均 $(0.287\pm 0.128)\text{ g}\cdot\text{d}^{-1}$,氟伏沙明 $50\sim 300\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,平均 $(142.94\pm 74.27)\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$;对照组34例,单用氟伏沙明治疗,氟伏沙明剂量 $50\sim 300\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,平均 $(151.36\pm 76.39)\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$,均为口服.两组氟伏沙明均在2周内加至治疗量,治疗8周,期间酌情使用苯二氮类类药物.用耶鲁布郎强迫量表(Y-BOCS)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评定疗效,治疗中出现的症状量表(TESS)评定不良反应.结果治疗组脱落3例,对照组脱落1例.治疗8周末,对照组和治疗组有效率分别为60.6%和83.9%,两组间比较差异有统计学意义($P<0.05$);对照组和治疗组在治疗后2,4,8周末Y-BOCS评分和HAMA评分与治疗前比较均有改善,差异均有统计学意义($P<0.05$ 或 $P<0.01$);治疗4,8周末治疗组Y-BOCS评分明显低于对照组,差异有统计学意义($P<0.01$);治疗2周末起,每周HAMA评分治疗组均低于对照组,差异均有统计学意义($P<0.05$ 或 $P<0.01$).结论单用氟伏沙明或氟伏沙明联合喹硫平治疗难治性强迫症均有效,联合用药疗效更显著.

关键词 [喹硫平](#) [氟伏沙明](#) [强迫症,难治性](#)

分类号 [R971.4](#) [R749.7](#)

DOI: 10.3870/yydb.2012.10.017

对应的英文版文章: [1004-0781\(2012\)10-1305-03](#)

通讯作者:

作者个人主页: 朱倩芸;冯晓薇

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1096KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“喹硫平”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [朱倩芸](#)
 - [冯晓薇](#)