

李惠兰, 陈涛, 吴智勇, 欧阳锋. 帕金森病后抑郁的相关因素研究[J]. 中国康复医学杂志, 2008, (6): 521-522

帕金森病后抑郁的相关因素研究 [点此下载全文](#)

[李惠兰](#) [陈涛](#) [吴智勇](#) [欧阳锋](#)

海南省人民医院护理部, 海南省海口市秀英区秀华路19号, 570311

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 110

全文下载次数: 154

摘要:

目的: 探讨帕金森病(PD)后抑郁发病的相关因素。方法: 收集门诊及住院的PD患者共100例, 所有患者按ICD-10 F06.32器质性抑郁障碍诊断标准进行诊断, 并应用抑郁自评量表(SDS)、Hamilton抑郁量表(HAMD)评定后, 筛选出抑郁症患者, 随机分为抑郁组和非抑郁组。应用一般情况调查表、SDS、HAMD、PD综合评分量表(UPDRS)评定, 对相关因素进行单因素及多因素偏相关分析。结果: 100例PD患者中出现抑郁症状42例, 占42.0%。女性、丧偶、家庭不支持配合、UPDRSIII评分高、未应用多巴胺受体激动剂治疗为PD后抑郁的相关因素。结论: 帕金森病后抑郁发病率高, 其相关因素复杂, 抑郁的发生可能是社会心理、神经生物学多种因素作用的结果。

关键词: [帕金森病](#) [抑郁](#) [相关因素](#)

A study of related factors of depression after Parkinson's disease [Download Fulltext](#)

People's Hospital of Hainan Province, Haikou, 570311

Fund Project:

Abstract:

Objective: To investigate the related factors of depression after Parkinson's disease (PD). Method: One hundred patients with PD were assessed by Hamilton Depression Rating Scales (HAMD), Self-Rating Depression Scale (SDS), and a self-designed questionnaire. Related factors were analyzed. Patients with depression after Parkinson's disease were treated with Citalopram. Result: Forty-two cases (42.0%) were identified as suffering from depression. Sex, marriage, family relation, UPDRSIII, dopamine agonists were related factors. Conclusion: The related factors of depression after Parkinson's disease are complex.

Keywords: [Parkinson's disease](#) [depression](#) [related factors](#)

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 259761 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计