



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2005期 >> 第12期

盆腔淋巴结清扫术后淋巴囊肿形成患者的护理

郑小琴

(广西第二人民医院妇科 广西桂林)



浏览次数 242996



资料库

| | | |
|-------|------|------|
| 2007年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | | |
| 2006年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 第7期 | 第8期 | 第9期 |
| 第10期 | 第11期 | 第12期 |
| 2005年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 第7期 | 第8期 | 第9期 |
| 第10期 | 第11期 | 第12期 |
| 2004年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 第7期 | 第8期 | 第9期 |
| 第10期 | 第11期 | 第12期 |
| 2003年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |

[摘要] 淋巴囊肿的形成是妇科恶性肿瘤根治术后严重并发症之一,严重影响患者的生活质量,常伴有发热、下肢疼痛、下肢水肿、行走不便、腹胀、排尿困难。做好相关护理,减少淋巴囊肿的形成对提高患者的生活质量起着至关重要的作用。具体措施如下:(1)做好引流管的护理,预防淋巴囊肿的形成,主要通过掌握引流的位置、方法、时间来进行,同时严密观察引流液的性质、量、颜色,保持引流管的通畅,避免扭曲、粘连、阻塞、预防感染发生。(2)做好并发症如发热、下肢疼痛、排尿困难等护理。(3)做好患者的心理护理,消除紧张、恐惧心理,配合治疗。

[关键词] 妇科恶性肿瘤 盆腔淋巴结清扫术 淋巴囊肿 护理

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

| | | |
|-------|-----|-----|
| 2002年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 2001年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| 2000年 | | |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 第4期 | 第5期 | 第6期 |

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **300385** 位访客