



服用减肥药和泻药减肥会增加女性饮食失调风险

日期：2021年06月10日 09:22 来源：科技部 【字号：大 中 小】

美国明尼苏达大学公共卫生学院研究团队经过近十年的追踪调查研究发现，服用减肥药和泻药会增加饮食失调风险，该研究成果发表在《国际饮食失调杂志》上。

美国明尼苏达大学公共卫生学院纽瓦克教授领导的团队对参与EAT项目（青少年饮食和活动）1015名女性志愿者进行跟踪调查，入选志愿者起初没有饮食失调等疾病，研究人员对其从青春期到成年初期近十年期间的行为和健康情况进行追踪，调查内容包括使用减肥药和泻药以及饮食失调的诊断情况。研究发现，与未服用减肥药的参与者相比，使用减肥药的参与者被诊断出饮食失调的风险高258%。与不服用泻药控制体重的人相比，使用泻药控制体重的人患进食障碍诊断的风险要高177%。

纽瓦克表示，长期跟踪调查结果证明，服用减肥药和泻药极可能增加女性饮食紊乱风险，甚至发展成为严重的饮食失调疾病。研究团队下一步计划研究减肥药和泻药对男性进食障碍的影响。



打印本页 »

关闭窗口 »



版权所有：中华人民共和国科学技术部

办公地址：北京市西城区文兴东街1号国谊宾馆（过渡期办公） | 联系我们

邮政地址：北京市海淀区复兴路乙15号 | 邮政编码：100862

ICP备案序号：京ICP备05022684 | 网站标识码：bm06000001 | 建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器