



国际口腔医学杂志 2011, Vol. 38 Issue (6) : 656-658 DOI:

论著

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#) << [Previous Articles](#) | [Next Articles](#) >>

下颌功能性正中偏移与上颌第一磨牙牙龈萎缩的关系

赖依玲 汪永跃 宫苹

四川大学华西口腔医院种植科 成都 610041

摘要	参考文献	相关文章
--------------------	----------------------	----------------------

Download: [PDF](#) (115KB) [HTML](#) 1KB Export: [BibTeX](#) or [EndNote](#) (RIS) [Supporting Info](#)

摘要 目的 观察中线偏移与第一磨牙牙龈萎缩的关联性。方法 选取32例无缺牙、无颞下颌关节功能紊乱,第一磨牙位于牙弓的正确位置上且没有偏向颊侧或腭侧的患者,制取上下颌印模,上颌模型以面弓转移至第三类架上,并以正中关系记录将模型固定于架上。观察下颌从正中关系位到牙尖交错位之间的运动途径,检测是否有下颌中线偏移,并测量上颌第一磨牙腭侧牙龈萎缩的程度。结果 有中线偏移者15例,没有中线偏移者17例。上颌第一磨牙的腭侧牙龈萎缩者18例,没有萎缩者14例。以相关系数的公式统计计算得到2项变量的相关系数为0.828,显示2项变量有高度相关性。结论 下颌功能性正中偏移与上颌第一磨牙牙龈萎缩有高度相关性。

关键词: [下颌功能性正中偏移](#) [牙龈萎缩](#) [正中关系位](#)

Abstract:

Keywords:

引用本文:

赖依玲 汪永跃 宫苹. 下颌功能性正中偏移与上颌第一磨牙牙龈萎缩的关系[J] 国际口腔医学杂志, 2011, V38(6): 656-658

[J], 2011, V38(6): 656-658

Service

- [把本文推荐给朋友](#)
- [加入我的书架](#)
- [加入引用管理器](#)
- [Email Alert](#)
- [RSS](#)

[作者相关文章](#)