

中国人民大学

Renmin University
of China



性社会学研究所

Institute for Research on
Sexuality and Gender

<http://www.sexstudy.org>

[首页](#) | [学科建设](#) | [基础研究](#) | [应用研究](#) | [著作发布](#) | [图书检索](#) | [通俗文章](#) | [文献介绍](#) | [讨论地带](#) | [通讯文档](#)

您的位置: [首页](#) -> 译著《金西报告: 男性与女性的性行为》

18_当前美国男女性行为与艾滋病 (金西研究所所长赖尼希专门授权本书发表)

作者: (美) 金西 等著, 潘? 来源: 类别: 译著《金西报告: 男性与女性的性行为》 日期: 2005. 02. 22 今日/总浏览: 1/2326

《女性性行为——金西报告续篇》, 潘绥铭翻译, 团结出版社, 1990年5月出版

附录:

当前美国男女性行为与艾滋病

(金西研究所所长赖尼希专门授权本书发表)

在高危地区的性接触

1987年8月1日, 传染病控制中心宣布, 美国10个城市为艾滋病最高发病率地区; 纽约、纽瓦克、旧金山、洛杉矶、休斯敦、华盛顿、迈阿密、芝加哥、费城、达拉斯。我们调查的262名女同性恋者中, 1980年以后有30%的人与这些地区的人有过性交, 其中34%是与男人, 其中一半的人与新的性伙伴。

样本情况

我们调查到的262名女同性恋者, 取自5, 000-7, 000名妇女的调查。她们从19岁到70岁, 平均为33岁, 来自34个州、两个特区与加拿大和新西兰。其中白人女性占94%; 上过大学者占46%; 大学毕业生占40%; 平均年收入为22, 761美元。

我们提了这样一个问题: “你认为自己在过去12个月里是个什么样的人? 答: a、异性恋者; b、兼性恋者; c、同性恋者。” 我们下面要分析的262名女性, 都是自愿选择同性恋者这一标签的人。

这些人中，从18岁起59%的人至少在某时曾自命为异性恋者；13%曾自命为兼性恋者，只有28%的人一直自认为是同性恋者。其中20%的女子与男人结了婚；15%的人有孩子，最多的一个女子有13个孩子。

与男性的性行为

由于我们现行的西方文化把同性恋看作一个意识形态问题，许多男同性恋者或兼性恋者不愿让别人知道自己是这样的人，尤其不愿让自己的女性伙伴知道。但是如果女伴也是个同性恋者或兼性恋者，他就不必隐瞒自己的性指向。况且，在某些同性恋者聚会的场所，男女同性恋者都很容易辩明对方的身份，相互不需要隐瞒，因此，我们调查的女子，对其男伴的性指向，有把握认清与认准。

阴茎与阴道的性交

262名女同性恋者中，40%的人与男伴发生过阴茎与阴道的性交，在1980年以后与男子有过性关系的人中88%都这样做过，她们不问男方的性指向，这表现为：只与异性恋男子有性关系的女子中，也有89%的人与他性交过。

不过，与异性恋男子性交的女子，47%至少用过一次避孕套；而与兼性恋男子性交的女子，却有61%的人用过避孕套。但另一方面，两种情况下，仍有76%和79%的女子曾在无防护的情况下，让男方在阴道内射精。只有4%和6%的女子一直坚持使用避孕套或其它防护措施。

经血来潮期内61%的女子有过至少一次阴茎与阴道性交，61%的女子让男方无防护在阴道内射精（在行经期内），只有8%的女子在行经期内坚持使用避孕套。

阴茎与肛门的性交合

许多医学专家误以为异性之间的肛门性交非常罕见，其实至少25%的美国女性偶然有过，至少10%的女性一直从事之。沃依勒尔1983年估计：“有过异性肛门性交的美国男女，至少是同性恋男子的两倍。”

1980年以来，与男子有过性关系的女同性恋者中，30%的人有过肛门性交。这方面，男方的性指向很重要。与异性恋男子有过肛门性交的女子占23%，与兼性恋男子有过的却达45%。但在防护措施方面，情况却相反：与异性恋男子肛门性交的，有42%至少用过一次避孕套，而与兼性男子肛门性交的，却只有12%用过，总共只有3个女子一直坚持在肛门性交中使用避孕套。

口与肛门接触

1980年以来，与男子有过性关系的女同性恋者中，13%的人无防护地从事过口腔肛门接触。与异性恋男子有过的只占9%，而与兼性恋男子有过的却达24%。

在与兼性恋男子有过口与肛门接触的女子中，44.5%是既刺激男方，又让男方刺激自己，在与异性恋男子有过的女子中，29%是既输出又接受；14%只输出；57%只接受。

原因

数据表明：1980年以来，更多的女同性恋者投入了与男子的艾滋病高危性活动。其中涉及肛门的性活动，又多是与兼性男子发生的。这是由于：兼性恋男子总是更多地要求肛门性活动。与他们发生性行为的女子，也总是对肛门性活动更感兴趣；或者是由于女子既然有了一个兼性恋男伴，她就更想知道男子同性性行为的内容，也更想以身一试。至于更深层的原因。我们尚缺乏资料。如果我们假设女同性恋者对自己的男伴更有独立性，而异性恋女子却更依附于男伴，那么异性恋女子中的艾滋病高危性活动恐怕会更多。显然，我们必须弄清楚，一个女子在高危性活动中为什么不肯运用性防护措施。

妓女与吸毒者

据传染病控制中心1981-1986年报告的全部女子艾滋病患者的情况分析，女性被传染的主要渠道是吸毒，还有就是与一个高危男子的异性性交，包括与男吸毒者性交。

亚尔莱斯1987年报告：800名纽约妇女中，至少有1/3的人吸毒和卖淫。在我们调查的262名女同性恋者中，1980年以来，卖过淫的有3人，吸过毒的有4人；与男妓性交过的有3人；怀疑男伴可能向男子卖过淫的有18人以上；与男吸毒者性交过的有6人；怀疑男伴吸过毒的占14%。

结论

艾滋病危机提醒人们，必须更深入地了解人类的性指向与性行为，因此必须考虑以下问题：

1. 科学对于人类性行为的知识，常常被人们扭曲地接受了。例如：人们总是相信，性指向标签即同性恋者、异性恋者、兼性恋者，必定说明该的实际性行为（如：选择什么对象，从事何种性行为等）；而这又决定了该人传染上艾滋病的机会有多大。我们的数据表明，至少对我们社会中的一些人来说，这种说法是错误的。
- 2、性指向与性行为绝不是一成不变的，两者都可以在一生中的某个时候转变，而且并不需要其他人的同意。
- 3、行为上的兼性恋者并不少，只是很少被人们认识到。
- 4、研究人类性行为，必须理解和重视：我们这样一个社会、文化和道德都多样化的国家里，个体差异非常之大。这就需要运用更为科学的理论与方法。

防止艾滋病的最好方法，就是加强生物医学与行为科学的研究。如果我们缺乏足够的资料，我们将无法制订相应的国家政策。

关闭窗口

文章版权归原作者所有，未经允许请勿转载，如有任何问题请联系我们。