

[首页](#)[期刊概况](#)[编委会](#)[专家学者](#)[网上投稿](#)[过刊浏览](#)[期刊订阅](#)[广告合作](#)

中国肿瘤临床 2012, Vol. 39 Issue (22): 1849-1852 DOI: doi:10.3969/j.issn.1000-8179.2012.22.039

[临床应用](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[\[an error occurred while processing this directive\]](#) | [\[an error occurred while processing this directive\]](#)

## 胆道系统恶性肿瘤术后患者临床病理特征及预后因素分析

韩如冰, 韩月婷, 黄鼎智, 李鸿立, 邓 婷, 周礼鲲, 白 明, 巴 一

天津医科大学附属肿瘤医院消化肿瘤内科, 天津市肿瘤防治重点实验室(天津市300060)

### Clinicopathological Characteristics and Prognostic Factors of Biliary Tract Cancer Patients Who had Undergone Surgery

Rubing HAN, Yueting HAN, Dingzhi HUANG, Hongli LI, Ting DENG, Likun ZHOU, Ming BAI, Yi BA

Department of Gastrointestinal Oncology, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Key Laboratory of Cancer Prevention and Treatment of Tianjin City, Tianjin 300060, China

[摘要](#)[参考文献](#)[相关文章](#)全文: [PDF \(1318 KB\)](#) [HTML \(1 KB\)](#) 输出: [BibTeX](#) | [EndNote \(RIS\)](#) [背景资料](#)

**摘要** 目的: 分析胆道系统恶性肿瘤根治术后患者临床病理特点及预后影响因素。方法: 回顾性分析116例于2006年1月至2010年12月在天津医科大学附属肿瘤医院接受R0手术切除的胆道系统恶性肿瘤患者预后相关因素, 进一步评估不同部位胆道系统恶性肿瘤临床病理特征及辅助化疗获益情况。结果: 单因素分析表明发病时肝侵犯、组织分化程度、神经血管浸润、淋巴结转移、TNM分期和化疗与否是影响胆道系统恶性肿瘤术后患者预后因素。多因素分析表明组织分化程度和化疗与否可作为独立的预后影响因子。不同部位胆道系统恶性肿瘤化疗获益情况不尽相同。结论: 组织分化程度与化疗与否为胆道系统恶性肿瘤术后患者独立预后因素。不同部位的胆道系统恶性肿瘤生物学行为不尽相同, 需要分别进行研究。

**关键词:** [胆系恶性肿瘤](#) [预后](#) [临床病理](#) [辅助化疗](#)

**Abstract:** Objective: This work aimed to analyze the clinicopathological characteristics and prognostic factors of biliary tract cancer patients who had undergone surgery. Methods: The medical records of 116 patients with biliary tract cancer who had undergone radical surgery in Tianjin Cancer Hospital between January 2006 and December 2010 were retrospectively analyzed. The clinicopathological characteristics and prognostic factors were analyzed. Results: Univariate analysis revealed that the liver invasion, tumor grading, lymphatic/vascular invasion, lymph node staging, tumor - node - metastasis classification of the World Health Organization, and adjuvant chemotherapy were associated with the prognosis of these patients. Multivariate analysis revealed that the tumor grades and adjuvant chemotherapy were the independent prognosis factors. The responses to adjuvant chemotherapy also varied with the tumor location. Conclusion: Tumor grading and adjuvant chemotherapy were independent prognosis factors of biliary tract cancer patients. Their biological behaviors and responses to adjuvant chemotherapy varied with the tumor location. These behaviors and responses may need to be separately considered and analyzed for effective individualized treatment.

**Key words:** [Biliary tract cancer](#) [Prognosis](#) [Clinicopathological factors](#) [Adjuvant chemotherapy](#)

收稿日期: 2012-08-12; 出版日期: 2012-11-30

通讯作者: 巴一 [E-mail: yiba99@yahoo.com](mailto:yiba99@yahoo.com)[引用本文:](#)

·胆道系统恶性肿瘤术后患者临床病理特征及预后因素分析[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(22): 1849-1852.

·Clinicopathological Characteristics and Prognostic Factors of Biliary Tract Cancer Patients Who had Undergone Surgery[J]. Chinese Journal of Clinical Oncology, 2012, 39(22): 1849-1852.

[链接本文:](#)[服务](#)[把本文推荐给朋友](#)[加入我的书架](#)[加入引用管理器](#)[E-mail Alert](#)[RSS](#)[作者相关文章](#)

没有本文参考文献

- [1] 曹 杉,任宝柱,张新伟,韩 颖,张维红,惠珍珍,戚 颖,杨雪娜,任秀宝. 74例肺癌患者GVAX治疗前后外周血树突状细胞变化及其临床意义[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 514-518.
- [2] 杜春娟,刘 亮,曹 水,熊艳娟,杜伟娇,齐 静,张 澎,安 阳,任秀宝. 细胞因子诱导的杀伤细胞治疗87例非小细胞肺癌临床疗效评价[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 519-523.
- [3] 李 状,王 琪,张 玮,阳志军,唐步坚,黄明钜,李 力. 卵巢癌组织中二氢叶酸还原酶基因的表达及其临床意义[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 564-569.
- [4] 刘晓东,汪 旭,贾勇圣,王 蕊,佟仲生. 三阴性对小肿块乳腺癌患者预后的影响[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 578-582.
- [5] 王春平,陆荫英,高旭东,王 铤,白文林,曲建慧,曾 珍,张敏娜,常秀娟. 索拉非尼治疗进展期肝细胞癌的疗效及预后因素分析[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 587-592.
- [6] 卢素琼,赵化荣,胡尔西旦·尼牙孜,刘 攀,张宋安,张 蕾,包永星. 局部肌层浸润性膀胱癌预后影响因素分析[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 593-596.
- [7] 尹婧婧,周礼鲲,李鸿立,巴 一. 循环肿瘤细胞与乳腺癌患者预后相关性的Meta分析[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(9): 602-606.
- [8] 杨艳芳, 刘 君, 姜战胜, 顾 林. VEGF在三阴性乳腺癌中的表达及临床意义[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(8): 439-.
- [9] 张 寰, 周晓颖, 张丽娜, 钱碧云. 碱基切除修复通路基因XRCC1、hOGG1多态性与吸烟对肺癌患者生存的影响[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(8): 447-451.
- [10] 潘利华, 陈雪松, 综述, 蔡 莉, 审校. 乳腺癌预后评估系统的研究进展[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(8): 472-475.
- [11] 王云翔, 范 宇, 张 勤, 王 彤, 刘 红. TopoII $\alpha$ 蛋白在不同分子亚型乳腺癌中的表达及其预后价值[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(7): 382-387.
- [12] 董娜娜,段晓峰,张侗,李慧锴,周洪渊,李强. 103例肝内胆管癌临床病理及诊治分析[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(6): 340-342.
- [13] 沈文斌, 祝淑钗, 高红梅, 李幼梅, 刘志坤, 李 娟, 苏景伟. 肿瘤体积和放疗剂量对局部晚期非小细胞肺癌预后的影响[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(5): 278-282.
- [14] 宋红林, 黄清华, 李 力. 新辅助介入化疗在局部晚期宫颈癌治疗中的价值[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(5): 283-286.
- [15] 李军楠, 刘晓东, 董国雷, 佟仲生. 2342例乳腺癌患者临床病理学特征及预后分析[J]. 中国肿瘤临床, 2012, 39(5): 287-291.

友情链接



版权所有 ©2013 《中国肿瘤临床》编辑部

地址: 天津市河西区体院北环湖西路肿瘤医院内 300060

电话/传真: (022)23527053 E-mail: cjco@cjco.cn cjcotj@sina.com 津ICP备1200315号