

经验交流

多西紫杉醇联合卡培他滨治疗蒽环类耐药晚期三阴性乳腺癌的临床观察

谢联斌,谢莉,袁丽方

解放军171医院肿瘤科

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 三阴性乳腺癌(TNBC)是指雌激素(estrogen receptor, ER)、孕激素受体(progesterone receptor, PR)和人类表皮生长因子受体2(HER-2)均为阴性的乳腺癌,约11.2%~16.3%乳腺癌患者属于此类型,常伴随BRCA1突变,是一类侵袭性强,治疗手段有限,预后较差的乳腺癌。由于缺乏有效的靶向内分泌治疗和抗HER-2治疗,因此化疗是该组患者的主要全身治疗选择,但对蒽环类耐药的患者目前尚无标准的解救治疗方案。研究发现多西紫杉醇和卡培他滨联合应用有协同作用,于是本院从2006年1月至2009年12月,采用多西紫杉醇联合卡培他滨治疗24例蒽环类耐药晚期三阴性乳腺癌患者,现将结果报告如下。

**关键词** [多西紫杉醇](#) [卡培他滨](#) [三阴性乳腺癌](#) [化疗](#)

分类号

**DOI:**

通讯作者:

作者个人主页: [谢联斌](#); [谢莉](#); [袁丽方](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#)(290KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“多西紫杉醇”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [谢联斌](#)
- [谢莉](#)
- [袁丽方](#)