

论著

不同化疗方案同期联合放疗治疗中晚期宫颈癌的临床观察

吴琼, 徐晓婷, 姬磊, 周菊英

215006 江苏苏州苏州大学附属第一医院放疗科

收稿日期 2013-10-12 修回日期 2013-12-3

网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的 探讨紫杉醇脂质体（力扑素）对比顺铂同期联合放疗治疗中晚期宫颈癌的疗效及不良反应。方法 选取45例 I B2期以上的局部中晚期宫颈癌患者分为力扑素组（n=26）和顺铂组（n=19），分别给予力扑素55mg / m<sup>2</sup>或顺铂30mg/m<sup>2</sup>每周静滴1次，共5次，两组均同时给予盆腔三维适形放疗（全盆腔总剂量45Gy / 25次）或后装治疗（A点剂量30~36Gy / 5~6次），比较两组的疗效及不良反应。结果 45例患者均顺利完成同期放化疗。力扑素组获CR 13例，PR 10例，SD 3例，无PD，有效率（RR）为88.5%；顺铂组获CR 12例，PR 3例，SD 3例，PD 1例，RR为84.2%，两组RR差异无统计学意义（P>0.05）。力扑素组和顺铂组的1年生存率分别为96.2%和89.5%，1年无进展生存率分别为92.3%和73.7%，两组比较差异无统计学意义（P>0.05）。不良反应均以1~2级为主，力扑素组的血液学毒性及消化道不良反应均低于顺铂组。结论 对局部中晚期宫颈癌患者采用力扑素或顺铂同期化疗方案同期放疗的疗效相当，但力扑素同期化疗同期联合放疗的不良反应较轻，值得临床推广应用。

**关键词** [宫颈癌；同期放化疗；顺铂；紫杉醇脂质体](#)

分类号

DOI:

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(889KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“宫颈癌；同期放化疗；顺铂；紫杉醇脂质体”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [吴琼](#)
- [徐晓婷](#)
- [姬磊](#)
- [周菊英](#)

对应的英文版文章: [2014190034](#)

---

通讯作者: