

临床应用

前列腺癌患者血浆D-二聚体水平及其临床意义

骆华春, 林贵山, 傅志超, 李东石, 程惠华¹, 郑文发, 程丽萍

350025 福州 安徽医科大学福总临床医学院 南京军区福州总医院放疗科

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨前列腺癌患者血浆D-二聚体水平, 并分析其与临床病理特征及预后的关系。方法 采用酶联免疫吸附法检测147例确诊前列腺癌患者(前列腺癌组)的血浆D-二聚体水平, 随访2年生存情况并分析其与临床病理参数(临床分期、盆腔淋巴结转移、远处脏器转移、前列腺特异抗原PSA水平和Gleason评分)及预后的关系。选取同期的92例良性前列腺疾病患者(良性疾病组)及70例男性健康体检者(健康体检组)作对照。结果 前列腺癌组D-二聚体水平为(0.52±0.04) mg/L, 均高于良性疾病组的(0.26±0.08) mg/L和健康体检组的(0.19±0.07) mg/L (P<0.05); 前列腺癌组不同临床分期、盆腔淋巴结转移、远处脏器转移、PSA水平、Gleason评分及预后的D-二聚体水平差异有统计学意义(P<0.05), 且III~IV期、有盆腔淋巴结转移、有远处脏器转移、PSA水平>20ng/ml、Gleason评分≥8分和死亡的D-二聚体水平高于对应项(P<0.05)。结论 前列腺癌患者的D-二聚体水平升高, 且与转移、临床分期、PSA水平及Gleason评分有关, 可能有助于评估前列腺癌患者的预后。

关键词 [前列腺癌](#); [D-二聚体](#); [预后](#); [转移](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2013180236](#)

通讯作者:

作者个人主页: [骆华春](#); [林贵山](#); [傅志超](#); [李东石](#); [程惠华¹](#); [郑文发](#); [程丽萍](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (822KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“前列腺癌; 体; 预后; 转移”的 相关文](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

- [骆华春](#)
- [林贵山](#)
- [傅志超](#)
- [李东石](#)
- [程惠华](#)
- [郑文发](#)
- [程丽萍](#)