

论著

新疆132例舌体鳞状细胞癌的预后分析

王博青, 刘攀, 赵化荣, 张宋安, 胡尔西旦·尼牙孜, 包永星

新疆医科大学第一附属医院肿瘤中心

收稿日期 2013-10-10 修回日期 2013-11-26 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 探讨影响新疆132例舌体鳞状细胞癌(TSCC)患者预后的因素。方法 病例为新疆医科大学第一附属医院2003年1月至2011年12月经病理确诊且随访资料完整的132例初治TSCC患者, 其中24例未手术, 108例手术(94例行颈部淋巴结清扫); 根据治疗方式分为单纯手术治疗29例, 单纯放疗10例及综合治疗93例。随访患者生存情况并采用Kaplan-Meier法进行生存分析, 分析不同临床病理参数(性别、民族、年龄、分化程度、T分期、N分期、TNM分期、侵犯舌根、侵犯中线、侵犯口底及局部复发)及治疗方式(原发灶手术、放疗、化疗、颈部淋巴结清扫及手术情况)的5年生存率, 同时采用Cox回归模型分析影响预后的独立因素。

结果 132例患者共随访5~120个月, 9例失访, 随访率为93.2%。61例生存, 死亡62例, 其中58例死于肿瘤相关疾病。132例患者的中位生存期为80.0个月, 5年生存率为59.8%。临床病理参数中不同分化程度、T分期、N分期、TNM分期、是否侵犯中线、侵犯口底和局部复发及不同治疗方式中的是否为原发灶手术、放疗、颈部淋巴结清扫和手术情况的5年生存率差异有统计学意义($P < 0.05$)。多因素分析显示, 分化程度、局部复发、原发灶手术、TNM分期和放疗是影响TSCC预后的独立因素。结论 原发灶彻底手术、合理颈部淋巴结清扫及预防局部复发能够改善TSCC患者的预后。早期TSCC建议首选手术治疗, 而中晚期首选以手术为主的综合治疗, 术后放疗的疗效较好。

关键词 [舌体鳞状细胞癌; 生存分析; 预后因素; 治疗方式](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2014190070](#)

通讯作者:

赵化荣 xydyfyzhr@163.com

作者个人主页: 王博青; 刘攀; 赵化荣; 张宋安; 胡尔西旦·尼牙孜; 包永星

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (992KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“舌体鳞状细胞癌; 生存分析; 预后因素; 治疗方式”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [王博青](#)
- [刘攀](#)
- [赵化荣](#)
- [张宋安](#)
- [胡尔西旦尼牙孜](#)
- [包永星](#)