



您当前的位置是: [首页](#) >> [资料库](#) >> [2006期](#) >> [第4期](#)

奥沙利铂不同输注速度外周神经毒性反应发生情况比较

吴朝晖 余慧茜 叶雪薇

(温州医学院附属二院胃肠外科 浙江温州 温州医学院附属二院胃肠外科 浙江温州)



资料库



浏览次数 241978

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的比较奥沙利铂(L-OHP)不同输注速度对神经毒性反应发生情况的影响。方法用奥沙利铂方案化疗的32例胃癌患者,第1周期采用常规方法,输注速度控制在2.8~4.2 ml/min,第2周期采用干预方法,输注速度控制在1.4~1.7 ml/min,进行不良反应发生情况的自身前后对照。结果使用常规方法发生神经毒性反应28例,采用干预方法发生神经毒性反应19例,两组比较有显著性差异(P<0.05);采用干预方法,神经毒性反应的发生程度也比较轻。结论减慢输注速度能降低奥沙利铂神经毒性反应的发生率。

[关键词] 奥沙利铂 神经毒性 输注速度 护理干预

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **302896** 位访客