药物与临床

拉米夫定停药后肝炎的临床分析

焦建中, 李晓云, 胡浩, 王秀丽, 冯雪梅, 席亚莉

解放军第一医院传染科, 兰州730030

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-9-25 接受日期

摘要 目的分析拉米夫定停药后肝炎的复发率、临床特点及防治策略。方法对拉米夫定治疗后停药的肝炎患者进行>1 a的随访观察。结果拉米夫定停药后肝炎的复发率为17.7%,平均发生时间为16周,对发生血清转换(HBeAg/抗HBe)的患者停药后仍可出现拉米夫定停药后肝炎。结论对发生拉米夫定停药后肝炎的患者可再次应用拉米夫定或阿德福韦治疗。联合治疗是拉米夫定停药后肝炎的治疗策略之一。

关键词 拉米夫定 肝炎 停药后

分类号

DOI:

对应的英文版文章:1004-0781 (2005) 12-1130-02

通讯作者:

作者个人主页: 焦建中; 李晓云; 胡浩; 王秀丽; 冯雪梅; 席亚莉

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF(1437KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

▶ <u>本刊中 包含"拉米夫定"的 相关</u> 文章

▶本文作者相关文章

- 焦建中
- 李晓云
- 胡浩
- 王秀丽
- 冯雪梅
- 席亚莉