

最新公告

抑肽酶致过敏性休克51例文献病例分析

投稿时间： 2011-01-09 最后修改时间： 2011-03-05

DOI:

中文关键词: [抑肽酶](#) [过敏性休克](#) [药品不良反应](#) [病例报告](#)

英文关键词:

基金项目:

作者	单位
熊星华	丰城市人民医院 (江西丰城 331100)
雷招宝	丰城市人民医院 (江西丰城 331100)

摘要点击次数: 126

全文下载次数: 100

中文摘要:

摘要 目的: 探讨抑肽酶致过敏性休克的规律与特点, 为临床合理用药提供参考。方法: 检索国内医药数据库, 下载原始病例报告进行统计与分析。结果: 抑肽酶致过敏性休克与患者性别、给药途径与剂量等无关; 以速发型 (30 min以内发生者占84.3%) 为主, 缓发型仅占3.9%; 皮肤过敏试验过程中也可以发生; 外科手术麻醉期间发生过敏性休克者报告较多 (34例); 临床表现以循环系统、中枢神经系统和呼吸系统症状为主。经积极的抗过敏性休克抢救, 46例恢复正常, 5例死亡。结论: 坚持合理用药是预防抑肽酶发生过敏性休克的有效措施。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

关闭