

药物与临床

常规疗法联合清除幽门螺杆菌药物治疗急性冠状动脉综合征49例

王洪斌¹, 卫丽¹, 唐卫²

解放军第324医院1.干部病房; 2.心胸外科, 重庆400020

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-9-17 接受日期

摘要 目的观察常规疗法联合清除幽门螺杆菌(Hp)药物治疗非ST段抬高急性冠状动脉综合征(ACS)的疗效。方法 80例ACS患者,随机分为两组。对照组31例给予常规扩张血管、抗炎、抗凝血和稳定脂质斑块治疗;治疗组49例在给予上述治疗的同时加用清除Hp的药物(枸橼酸铋雷尼替丁,每次350 mg, bid;阿莫西林,每次1.0 g, bid;呋喃唑酮,每次100 mg, bid)。两组疗程均为2周。结果治疗组总有效率(胸痛发作减少或消失、心电图ST段下移至正常范围或好转患者所占比例)93.9%;对照组为77.4%。治疗组疗效明显优于对照组($P < 0.05$)。治疗组治疗后C反应蛋白含量为(9.24 ± 3.47) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$,对照组为(12.64 ± 5.39) $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$,治疗组明显低于对照组;治疗组和对照组治疗前Hp检出率分别为88.3%和86.7%,治疗后分别为17.5%和83.4%,治疗组Hp清除率明显高于对照组($P < 0.05$)。结论常规疗法联合清除Hp药物治疗ACS疗效显著,值得临床推广。

关键词 [雷尼替丁](#) [枸橼酸铋](#) [呋喃唑酮](#) [冠状动脉综合征](#) [急性](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章:[1004-0781 \(2005\) 08-0698-02](#)

通讯作者:

作者个人主页:王洪斌¹;卫丽¹;唐卫²

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1526KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“雷尼替丁”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [王洪斌](#)

• [卫丽](#)

• [唐卫](#)