

药物与临床

含长春瑞滨方案治疗非霍奇金淋巴瘤48例

谢正强¹,李开俊²,权瑞泉¹,匡黎¹,殷娟¹,张谦¹,李宏章¹

鄖阳医学院附属东风总医院1.肿瘤科; 2.药学部, 湖北十堰442008

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-20 接受日期

摘要 目的观察含长春瑞滨方案治疗非霍奇金淋巴瘤(NHL)的疗效及不良反应。方法回顾性分析48例含长春瑞滨方案治疗成人非霍奇金淋巴瘤患者的临床资料。结果初治有效率为91.7%; 复治有效率为83.3%; CHOP方案的有效率为85.7%。含长春瑞滨方案较CHOP方案对中、晚期患者更有效,对CHOP治疗复发的非霍奇金淋巴瘤疗效也较好,不良反应中骨髓抑制、静脉炎及消化道反应明显,其他不良反应轻微。结论含长春瑞滨方案疗效肯定,可作为中、晚期CHOP治疗后复发非霍奇金淋巴瘤治疗选择方案之一。

关键词 [长春瑞滨](#) [化学治疗](#) [淋巴瘤,非霍奇金](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2006\) 12-1286-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 谢正强¹;李开俊²;权瑞泉¹;匡黎¹;殷娟¹;张谦¹;李宏章¹

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1154KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“长春瑞滨”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [谢正强](#)
- [李开俊](#)
- [权瑞泉](#)
- [匡黎](#)
- [殷娟](#)
- [张谦](#)
- [李宏章](#)