

## 药物与临床

### 尼莫地平联合茴拉西坦治疗血管性痴呆54例

程丽丹<sup>1</sup>, 江一唱<sup>2</sup>, 谭倩<sup>3</sup>

(1.湖北省新华医院药学部, 武汉430015; 2.华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部, 武汉430030; 3.湖北省新华医院神经内科, 武汉430015)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 摘要目的观察尼莫地平联合茴拉西坦治疗血管性痴呆的临床疗效。方法血管性痴呆患者97例, 分为治疗组54例, 对照组43例。治疗组先给予尼莫地平10 mg 静脉滴注, qd, 连续3周后改口服30 mg, tid, 并口服茴拉西坦200 mg, tid, 共12周; 对照组单用尼莫地平治疗, 方法同治疗组。结果两组患者治疗12周后, 治疗组临床症状明显改善, 平均有效率85.2%, 对照组平均有效率67.4% (P<0.05)。结论尼莫地平联合茴拉西坦是治疗血管性痴呆的较佳组合。

**关键词** [关键词尼莫地平](#); [茴拉西坦](#); [痴呆,血管性](#)

**分类号** [R971](#); [R749.1](#)

**DOI:** 10.3870/yydb.2012.06.019

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2012\) 06-0740-02](#)

通讯作者:  
江一唱

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1089KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“关键词尼莫地平; 茴拉西坦; 痴呆,血管性”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [程丽丹](#)
- [江一唱](#)