

最新公告

莲必治注射液不良反应148例文献分析

投稿时间： 2011-11-12 最后修改时间： 2012-03-06

DOI:

中文关键词: [莲必治注射液](#) [药品不良反应](#) [文献分析](#)

英文关键词:

基金项目:

作者	单位
李贤文	江苏省苏北人民医院药剂科(江苏扬州 225001)

摘要点击次数: 68

全文下载次数: 48

中文摘要:

摘要 目的: 分析莲必治注射液不良反应的临床表现, 为临床安全用药提供参考。方法: 利用万方医药数据镜像系统和中国知网检索1999~2010年国内医学期刊, 搜集莲必治注射液不良反应病例进行回顾性分析。结果: 检索获得莲必治注射液不良反应文献20篇, 病例148例, 因累及多个系统, 不良反应194例次, 其中严重不良反应8例次。泌尿系统损害73例次, 占37.63%; 过敏反应86例次, 占44.33%。过敏反应多发生在给药后2~90 min, 泌尿系统损害多发生在用药后30 min~5 d。148例不良反应中联合用药102例, 占68.9%, 单用莲必治注射液46例, 占31.1%。结论: 莲必治注射液不良反应主要表现为急性肾损害和过敏反应, 临床应用时应详细询问患者的药物过敏史以及个人和家族疾病史, 严格掌握适应证, 按照药品说明书的规定, 严格控制药物输液的浓度和速度。应避免不必要的联合用药。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

关闭