

最新公告

加替沙星不良反应/事件报告回顾性分析及用药评价

投稿时间： 2012-06-20 最后修改时间： 2012-09-12

DOI:

中文关键词: [加替沙星](#) [药品不良反应/事件](#) [适应证](#)

英文关键词:

基金项目:

作者	单位
戴志凌	昆明医科大学第二附属医院药剂科 (昆明 650101)
崔岚	昆明医科大学第二附属医院药剂科 (昆明 650101)
班立丽	昆明医科大学第二附属医院药剂科 (昆明 650101)
曾海萍	昆明医科大学第二附属医院药剂科 (昆明 650101)
李珂佳	昆明医科大学第二附属医院药剂科 (昆明 650101)

摘要点击次数: 49

全文下载次数: 57

中文摘要:

摘要 目的: 对我院上报的加替沙星不良反应/事件报告进行调查分析, 为临床提供合理用药参考。方法: 收集我院2007~2011年上报的54例加替沙星不良反应/事件报告资料, 进行统计分析及临床应用评价。结果: 54例患者中, 男6例, 女48例。加替沙星不良反应以皮肤及其附件损害、神经系统损害和胃肠系统损害为主, 分别占 17.65%、17.65%、13.73%。出现静脉炎的比例较高, 占12.75%。85.19%用于泌尿生殖系统抗感染治疗; 46.30%为抗感染治疗的用药指征不合理。结论: 加替沙星在临床广泛用于泌尿生殖系感染的经验治疗。临床应用时存在抗感染治疗的用药指征不合理、输注速度过快等不合理现象。临床医生应严格掌握加替沙星用药指征, 以减少不良反应的发生, 减缓细菌耐药性的增长。

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

[关闭](#)