

## 用药指南

### 丹参注射用灭菌粉末与常用输液的配伍稳定性考察

张春泉,项迎春,王立清

浙江医院药剂科,杭州310013

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的:考察丹参注射用灭菌粉末与临床常用输液配伍的稳定性.方法:模拟临床用法,将丹参注射用灭菌粉末与临床输液配伍,采用酸度法测定pH值、紫外分光光度法测定含量,观察配伍后混合液的外观、pH值和含量的变化.结果:室温25℃和水浴37℃,8 h内丹参注射用灭菌粉末与各输液配伍的混合液均澄清,但随着时间的延长、温度的升高,各混合液的颜色渐变深、pH值和含量均有不同程度下降.结论:室温37℃以上时,丹参注射用灭菌粉末在乳酸钠林格液中应4 h滴完,在复方氯化钠溶液中应在6 h滴完,在其他4种输液中8 h内无明显影响.

**关键词** [丹参注射用灭菌粉末](#) [配伍](#) [稳定性](#) [紫外分光光度法](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章:[1004 0781\(2003\)08 0581 02](#)

通讯作者:

## 扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (934KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (OKB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“丹参注射用灭菌粉末”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [张春泉](#)
- [项迎春](#)