

## 药物与临床

文拉法辛治疗持续性躯体形式疼痛障碍35例

徐景环<sup>1</sup>,李松芝<sup>2</sup>

山东省滨州市人民医院1.药剂科; 2.精神科, 256610

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的: 观察文拉法辛治疗持续性躯体形式疼痛障碍的疗效。方法: 将持续性躯体形式疼痛障碍初诊患者70例随机分为治疗组和对照组各35例, 两组分别给予文拉法辛和阿米替林, 均以25 mg, po, bid, 根据病情渐增至50 mg, po, tid。分别在治疗后第4天和第1, 2, 4周评定疗效。结果: 治疗组和对照组完全缓解分别为9, 8例, 明显缓解分别为13, 10例, 轻度缓解分别为8, 10例, 无效分别为5, 7例; 有效率分别为85.71%, 80.00%; 两组间差异无显著性( $P > 0.05$ )。但治疗组口干、便秘、视物模糊、心动过速、嗜睡等不良反应明显比对照组少( $P < 0.01$ )。结论: 文拉法辛对持续性躯体形式疼痛障碍疗效好, 不良反应小, 安全性高。

**关键词** [文拉法辛](#) [阿米替林](#) [躯体形式疼痛障碍,持续性](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [1004-0781\(2004\)06-0392-02](#)

通讯作者:

## 扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1125KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“文拉法辛”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [徐景环](#)
  - [李松芝](#)