

用药指南

卡马西平治疗癫痫 血药浓度监测回顾性分析

杨秀斐¹, 余玉木¹, 姜建梅²

1. 浙江省温州市第二人民医院药剂科, 325000; 2. 南京华东医药有限公司第17药房, 210009

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 研究卡马西平治疗癫痫 剂量、疗效与血药浓度的关系。方法: 采用荧光偏振免疫法测定245例次癫痫患者卡马西平血药浓度。结果: 达有效血药浓度(4~12 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)193例次(78.78%), 低于下限45例次(18.37%), 高于上限7例次(2.85%)。结论: 卡马西平血药浓度监测具有重要的临床意义。

关键词 [卡马西平](#) [血药浓度监测](#) [荧光偏振免疫法](#) [癫痫](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2004\)06-0418-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: [杨秀斐¹](#); [余玉木¹](#); [姜建梅²](#)

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1099KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“卡马西平”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [杨秀斐](#)
- [余玉木](#)
- [姜建梅](#)