

用药指南

122例感染性疾病患儿抗生素使用情况分析

何斌¹, 邵勇²

1. 山东省枣庄市立医院药剂科, 277102; 2. 山东省枣庄矿业集团公司滕南医院药剂科, 277606

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 为临床儿科合理用药提供参考。方法: 随机抽查儿科住院患者122例, 对其抗生素的使用率、给药途径、是否联合用药进行分析总结。结果: 头孢噻肟钠使用率18.85%, 哌拉西林钠使用率16.39%, 阿米卡星使用率14.75%, 青霉素使用率12.30%; 口服给药仅有3例; 联合用药阿米卡星占10.66%, 头孢哌酮钠占7.38%, 哌拉西林钠占5.74%, 头孢替唑钠4.09%。结论: 头孢菌素类儿科使用率较高, 注射用抗生素市场前景广阔, 儿科联合用药须慎重。

关键词 [抗菌药物](#) [合理用药](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2004\)06-0424-01](#)

通讯作者:

作者个人主页: 何斌¹; 邵勇²

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1028KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“抗菌药物”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [何斌](#)

• [邵勇](#)