

药物与临床

巴曲酶与尿激酶治疗急性脑梗死疗效比较

张经传¹,张经良²

1.山东省桓台县中医院药剂科, 256400; 2.山东省淄博市第四人民医院药剂科, 255067

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 比较巴曲酶与尿激酶治疗急性脑梗死的临床疗效及不良反应。方法: 将入选病例82例, 采用随机双盲对照方法分为治疗组42例和对照组40例, 两组均采用复方丹参、吡拉西坦等药物作为基础治疗, 治疗组给予巴曲酶20 U加入0.9%氯化钠注射液200 mL中, 静脉滴注, qd, 连用5 d后改为巴曲酶5 U, 连用5~10 d; 对照组给予尿激酶50万U加入0.9%氯化钠注射液200 mL中静脉滴注, qd, 连用5 d, 后改为尿激酶10万U, 连用5~10 d。结果: 治疗组总有效率85.7%, 对照组的总有效率85.0%, 两组疗效相当, 差异无显著性($P > 0.05$)。结论: 巴曲酶治疗急性脑梗死安全有效, 与尿激酶疗效相当, 但巴曲酶更经济实惠, 建议在临床推广。

关键词 [巴曲酶](#) [尿激酶](#) [脑梗死](#) [静脉溶栓](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781\(2004\)10-0747-02](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1154KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“巴曲酶”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [张经传](#)
- [张经良](#)