

用药指南

患者用药不依从性的原因与预防措施

刘洪平¹, 苏红兰²

1 山东省滨州市妇幼保健院药剂科, 256600; 2 山东省滨州市人民医院心胸外科, 256600

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-27 接受日期

摘要 探讨患者用药不依从性的主要原因及预防措施。根据患者不能正确遵守医嘱和对其用药指导的常见现象, 分析产生用药不依从性的主要原因有: 用药指导不到位; 用药方案复杂; 药物不良反应的发生和病情的好转; 不良广告宣传和经济承受能力; 药物剂型规格不适宜和使用说明不当; 对特殊患者缺乏用药监护。预防措施: 加强用药指导和医患沟通; 制定科学合理的用药方案; 对特殊患者监督用药; 改进药物剂型和包装。

关键词 [不依从性](#) [合理用药](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2005\) 03-0247-01](#)

通讯作者:

作者个人主页: 刘洪平¹; 苏红兰²

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1802KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“不依从性”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [刘洪平](#)
 - [苏红兰](#)