

药物不良反应

5种常用中药注射液的不良反应分析

蔡泳

浙江省嘉兴市中医医院药剂科, 314001

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-6-14 接受日期

摘要 目的分析常用中药注射液(复方丹参注射液、葛根素注射液、刺五加注射液、鱼腥草注射液、双黄连注射液等)不良反应(ADR)发生规律及特点,为临床合理用药及药物安全性评价提供依据。方法检索1999~2004年国内公开发表的医药期刊,对收集的ADR报告进行统计分析及评价。结果中药注射液引起的ADR与机体、药物、配伍禁忌、反复用药等因素有关,根据相关因素制订相应防范措施。结论应重视中药注射液的ADR,尤其应加强对年老、婴幼儿患者ADR的监测,促进临床合理用药。

关键词 [中药注射液](#) [不良反应](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2006\) 04-0370-02](#)

通讯作者:

蔡泳 ycai22@hotmail.com

作者个人主页: 蔡泳

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1230KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“中药注射液”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [蔡泳](#)