

药物与临床

播散型组织胞浆菌病临床特点与药物治疗

熊先智¹, 蔡淑清², 金阳¹, 张建初¹, 白明¹

华中科技大学同济医学院附属协和医院 1. 呼吸科; 2. 传染科, 武汉430022

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 2007-8-20 接受日期

摘要 目的 分析总结组织胞浆菌病例的临床特点, 以提高对该病的诊疗水平。方法 收集8例确诊并资料完整的病例, 进行回顾性分析总结。结果 组织胞浆菌病特点如下: 患者长期发热, 多系统损害, 消化、血液和呼吸系统常受累, 出现相应的症状和贫血貌、消瘦、皮肤出血点和肝脾肿大等体征; 轻度贫血, 外周血白细胞总数不增高或偏低, 中性粒细胞比例 <0.73 , 杆状核粒细胞偏高, 淋巴细胞减少或正常, 单核细胞比例偏高, C 反应蛋白增高程度明显高于血沉, 血IgG升高, 血浆清蛋白/球蛋白(A/G)比值降低; 特殊检查以肝脾和腹腔淋巴结肿大为主, 肝CT密度值下降疑似脂肪肝。结论 具有上述临床特征的患者应进行油镜下骨髓细胞学检查, 在巨噬细胞内发现组织胞浆菌, 并经骨髓真菌培养, 见双相生长的真菌而确诊。治疗用两性霉素B, 总剂量约350 mg, 疗效极佳。

关键词 [组织胞浆菌病](#) [发热](#) [肝大](#) [脾大](#) [两性霉素B](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2006\) 12-1273-03](#)

通讯作者:

作者个人主页: 熊先智¹; 蔡淑清²; 金阳¹; 张建初¹; 白明¹

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(1233KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“组织胞浆菌病”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [熊先智](#)
- [蔡淑清](#)
- [金阳](#)
- [张建初](#)
- [白明](#)