

药物与临床

利培酮口服液治疗老年偏执障碍26例

蔡忠全, 王萍

(辽宁省锦州市康宁医院, 121013)

收稿日期 2006-8-21 修回日期 网络版发布日期 2007-4-2 接受日期

摘要 目的 评价利培酮口服液治疗老年偏执障碍的疗效。方法 26例老年偏执障碍患者, 停用其他抗精神病药, 给予利培酮口服液, 低剂量开始($0.5 \sim 1.0 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$), 逐渐增量, 2周内增至治疗量, 平均($2.5 \pm 1.5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$), 以后维持该治疗量至12周不变。结果12周的有效率69.2%, 治疗中仅出现失眠、激越、心动过速和便秘。**结论** 利培酮口服液对老年偏执障碍有良好的功效, 不良反应少。

关键词 [利培酮](#) [偏执障碍](#)

分类号 [R971.41](#); [R749.8](#)

DOI:

对应的英文版文章: [261511](#)

通讯作者:

作者个人主页: [蔡忠全](#); [王萍](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1095KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“利培酮”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [蔡忠全](#)

• [王萍](#)