

## 药物与临床

### 贝拉唑与奥美拉唑三联疗法治疗十二指肠球部溃疡的疗效比较

曹建华

(山东省青岛市第三人民医院药剂科, 266041)

收稿日期 2007-2-12 修回日期 网络版发布日期 2008-1-17 接受日期

**摘要** 目的 探讨新型质子泵抑制药雷贝拉唑肠溶片三联疗法对十二指肠球部溃疡的疗效和幽门螺杆菌(Hp)根除率的影响. 方法 将65例Hp阳性的十二指肠球部溃疡患者分成治疗组37例, 对照组28例, 治疗组口服雷贝拉唑片10 mg, 阿莫西林胶囊1 g, 克拉霉素500 mg, bid, 7 d后, 继续口服雷贝拉唑片10 mg, bid, 连服7 d. 对照组口服奥美拉唑肠溶胶囊20 mg, 阿莫西林胶囊1 g, 克拉霉素500 mg, bid, 7 d后, 继续口服奥美拉唑胶囊20 mg, bid, 连服7 d. 疗程结束4周后复查胃镜并检测Hp, 观察两组十二指肠球部溃疡的愈合率和Hp的根除率, 同时于用药后第1, 2, 3, 7, 14天观察临床症状的改善情况. 结果 62例患者完成试验, 治疗组失访2例, 对照组失访1例. 治疗组的十二指肠球部溃疡愈合率为91.4%(32/35), Hp根除率为82.9%(29/35), 对照组分别为88.9%(24/27)和81.5%(22/27), 差异无显著性 ( $P>0.05$ ). 治疗组第1天和第2天症状缓解率分别为45.7%和68.6%, 高于对照组的14.8%和37%(均 $P<0.05$ ), 两组不良反应发生率分别为5.7%和7.4%. 结论 两组治疗方案均能有效清除Hp和缓解症状, 并有较高的溃疡愈合率.

**关键词** [雷贝拉唑](#) [奥美拉唑](#) [幽门螺杆菌](#) [溃疡](#), [消化性](#) [三联疗法](#)

分类号 [R975](#) [R573.1](#)

**DOI:**

对应的英文版文章: [270523](#)

通讯作者:

作者个人主页: [曹建华](#)

## 扩展功能

### 本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1199KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)

### 参考文献

### 服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)

### 引用本文

### Email Alert

### 文章反馈

### 浏览反馈信息

### 相关信息

- ▶ [本刊中 包含“雷贝拉唑”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
  - [曹建华](#)