

## 药物与临床

不同剂量氨氯地平及联合厄贝沙坦治疗原发性高血压的疗效和耐受性

赵乐萍<sup>1</sup>, 虞旭东<sup>2</sup>

(浙江省乐清市人民医院1.药剂科; 2.心血管科, 325600)

收稿日期 2007-6-27 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的 了解不同剂量氨氯地平及与厄贝沙坦联合用药治疗原发性高血压的疗效和耐受性. 方法 原发性高血压患者72例, 随机分为A、B、C 3组, 每组24例. A组口服氨氯地平缓释片, 每次5 mg, qd; B组口服氨氯地平缓释片每次5 mg, 口服厄贝沙坦片, 每次150 mg, qd; C组口服氨氯地平缓释片, 每次10 mg, qd. 观察患者的降血压效果、不良反应及对尿微量白蛋白 (Alb) 的影响. 结果 各组患者的血压从第2周起均有明显下降, 组间下降幅度比较差异无显著性. 第8周后, A、C组间的差异有显著性 ( $P < 0.05$ ). A组出现不良反应5例, B组2例, C组5例. 3组治疗后的尿Alb轻微下降, 与治疗前比较差异无显著性 ( $P > 0.05$ ). 结论 氨氯地平缓释片的降压效果呈时间依赖性, 而联合用药的耐受性明显好于单独使用大剂量氨氯地平缓释片.

**关键词** [氨氯地平](#) [厄贝沙坦](#) [高血压, 原发性](#) [耐受性](#)

分类号 [R972.4](#) [R544.1](#)

**DOI:**

对应的英文版文章: [270265](#)

通讯作者:

作者个人主页: [赵乐萍<sup>1</sup>](#); [虞旭东<sup>2</sup>](#)

## 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1301KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“氨氯地平”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [赵乐萍](#)

• [虞旭东](#)