

药物不良反应

七叶皂苷钠静脉滴注致深静脉炎3例

赵亚凝

(浙江省嘉兴学院附属第二医院药剂科, 嘉兴314000)

收稿日期 2007-7-27 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 例1,女,51岁。因右手挤压伤,右手毁损伤,右前臂皮缺损,机器绞伤致右上肢疼痛、出血2 h,2007年3月24日入院治疗。入院时体检:意识清,脉搏 80次 $\cdot\text{min}^{-1}$,呼吸率78次 $\cdot\text{min}^{-1}$,血压100/70 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa),体温 37 $^{\circ}\text{C}$,心率80次 $\cdot\text{min}^{-1}$,律齐。术后按医嘱给予5%葡萄糖注射液250 mL+七叶皂苷钠注射剂 10 mg,静脉滴注,约2 h,液体输至约250 mL时,患者右侧大隐静脉处出现疼痛,颜色发红,并沿静脉走向发展。考虑静脉炎,给予硫酸镁湿敷,但无明显消退,给予频谱仪照射,bid。睡前给予地西洋5 mg,po。安慰患者,稳定情绪,10 d后红肿消退,疼痛基本消失。痊愈出院。例2,男,45岁。因左手脱套伤后虎口挛缩6个月余,2007年4月11日入院治疗。医嘱给予5%葡萄糖注射液250 mL+七叶皂苷钠注射剂10 mg,静脉滴注,约95 min,液体输至约100 mL时,患者右前臂静脉处出现红肿疼痛。立即停止输液,更换输液器。给予频谱仪照射,bid,炉甘石洗剂外用。5 d后红肿消退。例3,男,19岁。因右食指大部分离断伤,2007年5月16日入院治疗。医嘱给予5%葡萄糖注射液500 mL+七叶皂苷钠注射剂10 mg,静脉滴注,约2 h,液体输至约350 mL时,患者沿静脉走向的皮肤呈索条状发红,其两边出现散在的点状或片状红色丘疹,伴疼痛。立即停止输液,更换输液器。给予频谱仪照射,bid,第2天红肿明显减退。

关键词 [七叶皂苷钠](#) [静脉炎](#) [不良反应](#)

分类号 [R286](#) [R543.6](#)

DOI:

对应的英文版文章:[W271024](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(1144KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“七叶皂苷钠”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [赵亚凝](#)