

药物研究

头孢呋辛序贯疗法的实验研究

陆晓彤¹, 唐跃年¹, 蒋樾廉², 彭峥如³

(1. 上海交通大学医学院附属新华医院药剂科, 200092; 2. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心药剂科, 200127; 3. 上海中医药大学, 201203)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 (1. [摘要] 目的观察头孢呋辛在实验犬体内的血浓度变化。方法采用随机自身交叉对照实验, 第一次采用实验犬静脉注射头孢呋辛钠 $50 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$; 第二次采用实验犬静脉注射头孢呋辛钠 $50 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 6 h后灌服头孢呋辛 $50 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 分别在不同时间采血1.0 mL进样测定, 计算头孢呋辛钠血浓度。结果头孢呋辛静脉给药后6~8 h与静脉加灌服给药后6~8 h的血药浓度比较, 差异有显著性。结论头孢呋辛的序贯疗法可提高药物治疗效果。

关键词 [头孢呋辛](#); [序贯疗法](#); [血药浓度](#); [犬](#)

分类号 [R978.11](#); [R965](#)

DOI: 10.3870/yydb.2009.03.003

对应的英文版文章: [2009-3-283](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1343KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (OKB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“头孢呋辛; 序贯疗法; 血药浓度; 犬”的 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [陆晓彤](#)
- [唐跃年](#)
- [蒋樾廉](#)