

药物与临床

退热解毒灵颗粒辅助治疗带状疱疹30例*

杨爱霞¹, 冯永芳², 谢岱¹

(武汉市第一医院1.药剂科; 2.皮肤科, 430022)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的观察退热解毒灵颗粒辅助治疗带状疱疹的临床疗效及不良反应。方法带状疱疹患者60例, 随机分为治疗组和对照组各30例。治疗组口服伐昔洛韦0.3 g, 退热解毒灵颗粒10 g, bid; 对照组口服伐昔洛韦0.3 g, bid。其他辅助治疗相同。疗程10 d。结果治疗组止疱时间、结痂时间、镇痛时间及病程均明显短于对照组(均 $P < 0.05$), 后遗神经痛发生率明显低于对照组($P < 0.05$)。结论退热解毒灵颗粒辅助治疗带状疱疹疗效较好, 值得临床推广应用。

关键词 [\[关键词\]](#) 退热解毒灵颗粒; 伐昔洛韦; 带状疱疹

分类号 [R986; R752.12](#)

DOI: [10.3870/yydb.2010.06.012](#)

对应的英文版文章: [2010-6-725](#)

通讯作者:

作者个人主页: 杨爱霞¹;冯永芳²;谢岱¹

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(381KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“\[\\[关键词\\]\]\(#\) 退热解毒灵颗粒; 伐昔洛韦; 带状疱疹”的 \[相关文章\]\(#\)](#)

▶ 本文作者相关文章

- [杨爱霞](#)
- [冯永芳](#)
- [谢岱](#)