

药物与临床

喹硫平治疗精神分裂症30例

朱丽娜¹, 胡红涛², 邵光琳²

武汉市汉口医院1.药剂科; 2.精神科, 430012)

收稿日期 2009-11-17 修回日期 2010-2-5 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 考察喹硫平治疗精神分裂症的有效性及安全性. 方法 将60例精神分裂症患者分为治疗组和对照组, 每组30例, 治疗组给予喹硫平, 初始剂量100 mg·d⁻¹, 2周内加至400~800 mg·d⁻¹, 以后3周内视病情及不良反应调整剂量, 最大剂量1 200 mg·d⁻¹, 平均(728.3±199.9) mg·d⁻¹. 对照组给予利培酮, 起始剂量1 mg·d⁻¹, 2周后加至治疗量3~6 mg·d⁻¹, 平均(4.9±0.9) mg·d⁻¹. 疗程均为8周, 两组根据情况给予苯海索、氮类药或普萘洛尔等对症处理, 以阴性和阳性症状量表(PANSS)、不良反应量表(TESS)分别评定疗效、病情严重程度和不良反应. 结果 治疗组与对照组的显效率均为70.0%, 有效率分别为90.0%和86.7%. 两组在治疗前PANSS评分差异无显著性, 在治疗8周末, 两组PANSS评分较治疗前显著下降, 均差异有极显著性(均P<0.01). 两组比较差异无显著性(P>0.05). 治疗组的不良反应较对照组少而轻. 结论 喹硫平可显著改善精神分裂症症状, 且不良反应发生率低, 是一种安全有效的抗精神病药物.

关键词 [喹硫平](#) [利培酮](#) [精神分裂症](#)

分类号 [R971.41](#) [R749.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.07.018

对应的英文版文章: [2010-7-885](#)

通讯作者:

作者个人主页: 朱丽娜¹; 胡红涛²; 邵光琳²

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1109KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“喹硫平”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [朱丽娜](#)
- [胡红涛](#)
- [邵光琳](#)