

## 用药指南

双波长-系数倍率法考察头孢唑肟钠与甲硝唑注射液配伍的稳定性

潘代勇<sup>1</sup>, 黄玲<sup>2</sup>, 吴佳黎<sup>2</sup>

(1. 柳州医学高等专科学校第一附属医院药剂科, 545002; 2. 柳州医学高等专科学校药学专业实习生班, 广西柳州545001)

收稿日期 2009-9-10 修回日期 2009-10-22 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的 考察头孢唑肟钠与甲硝唑注射液的配伍稳定性. 方法 采用等吸收双波长消除法及系数倍率法测定注射用头孢唑肟钠与甲硝唑注射液配伍后在37 ℃下放置6 h内不同时间的药物含量, 并观察溶液的色泽, 测定pH值. 结果 配伍液在37 ℃下3 h内药物含量、pH值和外观均无明显变化. 结论 注射用头孢唑肟钠与甲硝唑注射液可配伍使用, 但以不超过3 h为宜.

**关键词** [头孢唑肟钠](#) [甲硝唑](#) [配伍](#) [双波长](#) [系数倍率法](#)

分类号 [R978](#) [R969.2](#)

**DOI:** 10.3870/yydb.2010.07.045

对应的英文版文章: [2010-7-957](#)

通讯作者:

作者个人主页: 潘代勇<sup>1</sup>; 黄玲<sup>2</sup>; 吴佳黎<sup>2</sup>

## 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (1185KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“头孢唑肟钠”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [潘代勇](#)

• [黄玲](#)

• [吴佳黎](#)