

美机构称合用两种艾滋病药可致严重心脏异常


美国食品和药物管理局10月21日发表声明称，联合使用两种艾滋病治疗药物——罗氏公司出品的沙奎那韦和雅培公司生产的利托那韦，可能引发致命的心脏异常，该局已要求在这两种药的产品标签上添加警告。

声明说，经常联合使用这两种药可以导致服用者出现名为“尖端扭转型室性心动过速”的症状，进而导致可致命的心室颤动。此外，两药合用还可能引发名为“心脏传导阻滞”的心律失常症状。

“尖端扭转型室性心动过速”是一种特殊类型的多形态快速室性心律失常，心室颤动则是心室肌快速且微弱地收缩或不协调地快速乱颤，是导致心源性猝死的一种严重心律失常。

美食品和药物管理局官员爱德华·考克斯在声明中指出，这些心脏异常情况对生命构成潜在威胁，如果艾滋病病毒感染者对与上述药物有关的治疗方案心存疑虑，应尽快向医生咨询。由于其他一些药也可能与沙奎那韦发生反应，导致类似副作用，感染者应告诉医生目前服用的其他处方和非处方药以及维生素、植物性补充剂等情况。

特别声明：本文转载仅仅是出于传播信息的需要，并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性；如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用，须保留本网站注明的“来源”，并自负版权等法律责任；作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜，请与我们联系。

[打印](#) [发E-mail给:](#) 

以下评论只代表网友个人观点，不代表科学网观点。

目前已有0条评论

[查看所有评论](#)

读后感言：

验证码：